



南京大學  
NANJING UNIVERSITY

工程管理學院  
SCHOOL OF MANAGEMENT & ENGINEERING

# 函数逼近与计算

温丹苹

邮箱: [dpwen@nju.edu.cn](mailto:dpwen@nju.edu.cn)

办公室: 工管院协鑫楼306

- 1 基本概念
- 2 正交多项式
- 3 最佳平方逼近
- 4 曲线拟合的最小二乘法



# 1 基本概念

- 函数逼近

**目标：**在给定精度下求计算次数最少的近似公式，这就是函数逼近与计算要解决的问题。

- 对于函数类A中给定的函数 $f(x)$ ，要求在另一类较简单的便于计算的函数类B中，求函数 $P(x) \in B \subseteq A$ ，使 $P(x)$ 与 $f(x)$ 之差在某种度量意义下最小。

**注：**

- \* 本章研究的函数类A通常为区间 $[a, b]$ 上的连续函数，记 $C[a, b]$ 。
- \* 函数类B通常是代数**多项式或三角多项式**。





# 1 基本概念

- 函数逼近 vs 函数插值

**函数逼近**：给定  $f(x)$ ，在某个简单易算的函数类中找一个  $p(x)$ ，使得  $p(x)$  在某种度量下距离  $f(x)$  最近。

函数逼近中的两个关键点：

- (1) **函数空间**，即用什么样的函数来逼近  $f(x)$
- (2) **度量标准**，即采用什么样的评判标准

**函数插值**：给定 **数据表**，寻找到一个简单易算的  $p(x)$ ，使得  $p(x_i) = y_i$ 。

$x$	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
$\ln(x)$	-0.9163	-0.6931	-0.5108	-0.3567	-0.2231



# 1 基本概念

## ■ Weierstrass (魏尔施特拉斯) 定理

若函数  $p(x) \in H_n$ ,

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad \text{其中 } a_i \text{ 为实数}$$

$p(x)$  由系数唯一确定。  $1, x, \cdots, x^n$  线性无关, 是  $H_n$  的一组基,

$H_n = \text{span}\{1, x, \cdots, x^n\}$  是  $n+1$  维的,  $(a_0, a_1, \cdots, a_n)$  为  $p(x)$  的坐标。

### • Weierstrass 定理:

设  $f(x) \in C[a, b]$ , 则对任何  $\epsilon > 0$ , 总存在一个代数多项式  $p(x)$ , 使

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - p(x)| < \epsilon$$

在  $[a, b]$  上一致成立。





# 1 基本概念

- 函数的范数:

区间 $[a, b]$ 上的所有实连续函数组成一个空间, 记作  $C[a, b]$ .  $f \in C[a, b]$  的范数定义为

$$\|f\|_{\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|,$$

$\|\cdot\|_{\infty}$  称为 $\infty$ -范数, 它满足范数  $\|\cdot\|$  的三个性质:

- (1)  $\|f\| \geq 0$ , 当且仅当  $f \equiv 0$  时才有  $\|f\| = 0$ ;
- (2)  $\|af\| = |a| \|f\|$  对于任意  $f \in C[a, b]$  成立,  $a$  为任意实数;
- (3) 对于任意  $f, g \in C[a, b]$ , 有

正定

齐次

三角不等式

$$\|f+g\| \leq \|f\| + \|g\|.$$

★ 空间  $C[a, b]$  可与向量空间类比, 函数  $f \in C[a, b]$  可看成向量.





# 1 基本概念

- 函数的范数:

$C[a, b]$ :  $f \in C[a, b]$ , 可定义三种常用范数

- $\infty$ -范数或最大范数

$$\|f\|_{\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$$

- 1-范数

$$\|f\|_1 = \int_{\Omega} |f(x)| dx$$

- 2-范数

$$\|f\|_2 = \left( \int_{\Omega} f(x)^2 dx \right)^{1/2}$$



# 1 基本概念

- 两种常用度量标准

①一致逼近，或均匀逼近：

$$\|f(x) - P(x)\|_{\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)|$$

②平方逼近，或均方逼近：

$$\|f(x) - P(x)\|_2 = \sqrt{\int_a^b [f(x) - P(x)]^2 dx}$$

注：

\* 用于度量代数多项式 $P_n(x)$ 逼近 $f(x) \in C[a, b]$





# 1 基本概念

- 内积与内积空间:

设  $X$  是数域  $K(\mathbb{R}$  或  $\mathbb{C})$  上的线性空间,  $\forall u, v \in X$ , 有  $K$  中一个数与之对应, 记为  $(u, v)$ , 满足条件:

(1)  $(u, v) = \overline{(v, u)}, \forall u, v \in X;$

对称性

(2)  $(\alpha u, v) = \alpha(u, v), \alpha \in K, u, v \in X;$

齐次性

(3)  $(u + v, w) = (u, w) + (v, w), \forall u, v, w \in X$

可加性

(4)  $(u, u) \geq 0$ , 当且仅当  $u = 0$  时,  $(u, u) = 0$ .

正定性

则称  $(u, v)$  为  $X$  上  $u$  与  $v$  的内积。

**内积空间**: 定义了内积的线性空间。当  $K = \mathbb{R}$ , (1) 即  $(u, v) = (v, u)$  共轭

如果  $(u, v) = 0$ , 则称  $u$  与  $v$  正交, 这是向量垂直概念的推广。





# 1 基本概念

- 内积与内积空间:

例:  $\mathbb{R}^n$  的内积

设  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ , 则其内积定义为

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

由此导出向量 2-范数

$$\|\mathbf{x}\|_2 = (\mathbf{x}, \mathbf{x})^{1/2} = \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2}.$$

一般地, 若给定实数  $\omega_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ , 称之为权系数, 则可以定义加权内积

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \left( \sum_{i=1}^n \omega_i x_i^2 \right)^{1/2}.$$



# 1 基本概念

- 函数——内积与内积空间：

例:  $C[a, b]$  的内积

设函数  $f, g \in C[a, b]$ , 则其内积定义为

$$(f, g) = \int_a^b fg dx.$$

由此导出 2-范数

$$\|f\|_2 = (f, f)^{1/2} = \left( \int_a^b f(x)^2 dx \right)^{1/2}.$$



# 1 基本概念

- **Gram (格拉姆) 矩阵:** Gram矩阵是两两向量的内积组成, Gram矩阵可以反映出该组向量中各个向量之间的某种关系。

## 定理

设  $X$  为内积空间,  $u_1, u_2, \dots, u_n \in X$ , Gram 矩阵

$$G = \begin{pmatrix} (u_1, u_1) & (u_2, u_1) & \cdots & (u_n, u_1) \\ (u_1, u_2) & (u_2, u_2) & \cdots & (u_n, u_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (u_1, u_n) & (u_2, u_n) & \cdots & (u_n, u_n) \end{pmatrix}$$

对称  
矩阵

非奇异的充分必要条件是  $u_1, u_2, \dots, u_n$  线性无关。

**证明:**  $G$  非奇异等价于行列式  $\det G \neq 0$ , 等价于关于  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  的线性方程组

$$\left( \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j, u_k \right) = \sum_{j=1}^n (\alpha_j u_j, u_k) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

只有零解。





# 1 基本概念

注意到上式

$$\left( \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j, u_k \right) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\Leftrightarrow \left( \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j, \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n = 0.$$

线性无关意味着上式只有零解  $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ , 证毕。  
内积空间上可以由内积导出一种范数, 即

$$\|u\| = \sqrt{(u, u)}, \quad u \in X$$

容易验证满足范数定义三个条件。(满足正定、齐次、三角不等式)



# 1 基本概念

## ■ 内积与内积空间:

### • Cauchy-Schwarz不等式定理:

设 $X$ 为内积空间, 对 $\forall u, v \in X$ , 有  
 $| (u, v) |^2 \leq (u, u)(v, v)$ , 即  $| (u, v) |^2 \leq \|u\|_2 \cdot \|v\|_2$ .

### 证明.

当  $v = 0$  时, 显然成立。设  $v \neq 0$ , 对任何数  $\lambda$  有

$0 \leq (u + \lambda v, u + \lambda v) = (u, u) + 2\lambda(u, v) + \lambda^2(v, v)$ . 取  $\lambda = -(u, v)/(v, v)$ , 代入右端, 得

$$(u, u) - 2 \frac{|(u, v)|^2}{(v, v)} + \frac{|(u, v)|^2}{(v, v)} \geq 0,$$

由此即得  $v \neq 0$  时

$$| (u, v) |^2 \leq (u, u)(v, v).$$





# 1 基本概念

- 权函数:

定义 设在区间  $(a, b)$  内, 非负函数  $\rho(x)$  满足以下条件, 就称  $\rho(x)$  为区间  $(a, b)$  内的权函数:

1°  $\int_a^b |x|^n \rho(x) dx$  ( $n = 0, 1, \dots$ ) 存在;

2° 对于非负连续函数  $g(x)$ , 若

$$\int_a^b g(x) \rho(x) dx = 0,$$

则在  $(a, b)$  内  $g(x) \equiv 0$ .

\* 引入权函数的概念来对区间上每一点的重要性 (权重) 进行区分。





# 1 基本概念

- 带权的函数内积和范数:

例2  $C[a, b]$ 上的内积, 设  $f(x), g(x) \in C[a, b]$ ,  $\rho(x)$  是  $[a, b]$  上给定的权函数, 则可定义内积

$$(f(x), g(x)) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx. \quad (1.15)$$

容易验证它满足内积定义的四条性质, 由此内积导出的范数为

$$\|f(x)\|_2 = (f(x), f(x))^{\frac{1}{2}} = \left[ \int_a^b \rho(x) f^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (1.16)$$

称(1.15)式和(1.16)式分别为带权  $\rho(x)$  的内积和范数, 特别常用的是  $\rho(x) \equiv 1$  的情形, 即

$$(f(x), g(x)) = \int_a^b f(x) g(x) dx,$$

$\rho(x) = 1$  意味着所有区间中的点具有同等重要性。

$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  则意味着靠近区间端点处的点更加重要而区间中点处的点最不重要。



# 1 基本概念

- 最佳逼近多项式:

如果是在多项式中找最佳逼近, 那就是最佳多项式逼近。

定义: 记  $H_n$  为所有次数不超过  $n$  的多项式组成的集合, 给定函数  $f(x) \in C[a, b]$ , 若  $p^*(x) \in H_n$  使得

$$\|f(x) - p^*(x)\| = \min_{p(x) \in H_n} \|f(x) - p(x)\|$$

则称  $p^*(x)$  为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的  $n$  次最佳逼近多项式。

† 取不同的范数, 可以定义不同的最佳逼近方式。



# 1 基本概念

- 常用最佳逼近:

① 最佳一致逼近多项式:

$$\begin{aligned}\|f(x) - P^*(x)\|_\infty &= \min_{P(x) \in H_n(x)} \|f(x) - P(x)\|_\infty \\ &= \min_{P(x) \in H_n(x)} \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)|\end{aligned}$$

② 最佳平方逼近多项式:

$$\|f(x) - P^*(x)\|_2 = \min_{P(x) \in H_n(x)} \sqrt{\int_a^b [f(x) - P(x)]^2 dx}$$

# 1 基本概念

- 最小二乘拟合:

$x$	$x_0$	$x_1$	$\dots$	$x_m$
$f(x)$	$y_0$	$y_1$	$\dots$	$y_m$

## 什么是最小二乘拟合

给定数据表, 寻找  $g^*(x) \in \Phi$ , 使得

$$\sum_{i=1}^m |y_i - g^*(x_i)|^2 = \min_{g \in \Phi} \sum_{i=1}^m |y_i - g(x_i)|^2$$

称  $g^*(x)$  为  $f(x)$  的最小二乘拟合函数。

若  $\Phi = H_n$ , 则称  $g^*(x)$  为  $n$  次最小二乘拟合多项式。

† 最小二乘是数据拟合方法中常用的一种方法。



## 2 正交多项式

### ■ 函数的正交

定义：设  $f(x), g(x) \in C[a, b]$ ,  $\rho(x)$  是  $[a, b]$  上的权函数，若

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx = 0$$

则称  $f(x)$  与  $g(x)$  在  $[a, b]$  上带权  $\rho(x)$  正交。





## 2 正交多项式

### ■ 正交函数族

定义：设函数  $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_k(x), \dots \in C[a, b]$ ,

$\rho(x)$  是  $[a, b]$  上的权函数, 若

$$(\varphi_i, \varphi_j) = \int_a^b \rho(x) \varphi_i(x) \varphi_j(x) dx = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ A_i \neq 0, & i = j \end{cases}$$

则称  $\{\varphi_k(x)\}$  是  $[a, b]$  上带权  $\rho(x)$  的正交函数族。

- 若所有  $A_i = 1$ , 则称为 标准正交函数族。






# 2 正交多项式

## ■ 正交函数例子

例：三角函数系

$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots$

在  $[-\pi, \pi]$  上是带权  $\rho(x)=1$  的正交函数族。



证：通过直接计算可得

$$(1, 1) = \int_{-\pi}^{\pi} dx = 2\pi,$$

$$(1, \cos mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \, dx = 0, \quad (1, \sin mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \, dx = 0 \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

$$(\cos nx, \cos mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx = \pi \cdot \delta_{nm}$$

$$(\sin nx, \sin mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx \, dx = \pi \cdot \delta_{nm} \quad (m, n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$(\cos nx, \sin mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx \, dx = 0 \quad (m, n = 1, 2, 3, \dots)$$

Trigonometric\_function.m



## 2 正交多项式

### ■ 正交多项式

定义：设  $\varphi_k(x)$  是首项系数不为 0 的  $k$  次多项式， $\rho(x)$  是  $[a, b]$  上的权函数，若

$$(\varphi_i, \varphi_j) = \int_a^b \rho(x) \varphi_i(x) \varphi_j(x) dx = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ A_i \neq 0, & i = j \end{cases}$$

则称  $\{\varphi_k\}_{k=0}^{\infty}$  为  $[a, b]$  上带权  $\rho(x)$  正交，称  $\varphi_k(x)$  为  $k$  次正交多项式。

多项式序列





## 2 正交多项式

■ 当权函数 $\rho(x)$ 及区间 $[a, b]$ 给定之后, 可由线性无关的一组基 $\{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ 并利用正交化方法构造出**正交多项式序列** $\{\varphi_n(x)\}_0^\infty$ :

$$\varphi_0(x) = 1, \quad \varphi_n(x) = x^n - \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(x^n, \varphi_j(x))}{(\varphi_j(x), \varphi_j(x))} \cdot \varphi_j(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

- $\varphi_n(x)$ 是最高项系数为**1**的**n**次多项式。
- 若 $\{\varphi_n(x)\}_0^\infty$ 是正交多项式, 则 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 线性无关。

证:

若 $c_0\varphi_0(x) + c_1\varphi_1(x) + \dots + c_n\varphi_n(x) = 0$ ,

用 $\rho(x)\varphi_j(x)$  ( $j = 1, 2, \dots, n$ )乘以上式, 并积分得:

$$c_0 \int_a^b \rho(x)\varphi_0(x)\varphi_j(x)dx + c_1 \int_a^b \rho(x)\varphi_1(x)\varphi_j(x)dx + \dots + c_j \int_a^b \rho(x)\varphi_j(x)\varphi_j(x)dx + \dots + c_n \int_a^b \rho(x)\varphi_n(x)\varphi_j(x)dx = 0;$$

利用正交性, 则

$$c_j \int_a^b \rho(x)\varphi_j(x)\varphi_j(x)dx = 0,$$

由于 $(\varphi_j, \varphi_j) = \int_a^b \rho(x)\varphi_j(x)\varphi_j(x)dx > 0$ , 则 **$c_j = 0$ 对  $j = 1, 2, \dots, n$ 成立。**

因此:  $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 线性无关。





## 2 正交多项式

### ■ 正交多项式性质

**性质 1:** 设  $\{\varphi_k(x)\}_{k=0}^{\infty}$  为  $[a, b]$  上带权  $\rho(x)$  的正交多项式,  $H_n$  表示所有次数不超过  $n$  的多项式组成的线性空间, 则

$$\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)\}$$

构成  $H_n$  的一组基, 即对任何  $P(x) \in H_n$ ,

$$P(x) = \sum_{j=0}^n c_j \varphi_j(x)$$



## 2 正交多项式

### ■ 正交多项式性质

**性质 2:** 设  $\{\varphi_k\}_{k=0}^{\infty}$  为  $[a, b]$  上带权  $\rho(x)$  正交多项式, 则对  $\forall p(x) \in H_{n-1}$ , 有

$$(p(x), \varphi_n(x)) = \int_a^b \rho(x) p(x) \varphi_n(x) dx = 0$$

即  $\varphi_n$  与所有次数小于  $n$  的多项式正交。





## 2 正交多项式

### ■ 正交多项式性质

**性质 3** (三项递推关系): 设  $\{\varphi_n\}_{n=0}^{\infty}$  为  $[a, b]$  上带权  $\rho(x)$  正交多项式, 且首项系数均为 1, 则

$$\varphi_{n+1}(x) = (x - \alpha_n) \varphi_n(x) - \beta_n \varphi_{n-1}(x) \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

其中  $(x\varphi_n(x), \varphi_n(x)) = \int_a^b \rho(x)x\varphi_n^2(x)dx$

$$\varphi_{-1} = 0, \quad \varphi_0 = 1, \quad \alpha_n = \frac{(x\varphi_n, \varphi_n)}{(\varphi_n, \varphi_n)}, \quad \beta_n = \frac{(\varphi_n, \varphi_n)}{(\varphi_{n-1}, \varphi_{n-1})}$$

**性质 4:** 设  $\{\varphi_n\}_{n=0}^{\infty}$  为  $[a, b]$  上带权  $\rho(x)$  正交多项式, 则  $\varphi_n(x)$  在  $(a, b)$  内有  $n$  个不同的零点。





# 2 正交多项式

- 重要的正交多项式
  - 勒让德 (Legendre) 多项式

当区间为  $[-1, 1]$ , 权函数  $\rho(x) \equiv 1$  时, 由  $\{1, x, \dots, x^k, \dots\}$  正交化得到的多项式称为 Legendre 多项式:

$$P_0(x) = 1, \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

首项系数

$$\frac{2n(2n-1)\cdots(n+1)}{2^n n!} = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}$$

由于  $(x^2 - 1)^n$  是  $2n$  次多项式, 求  $n$  阶导数后得,

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} (2n)(2n-1)\cdots(n+1)x^{n+1} + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$$

令

$$\tilde{P}_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n,$$

则  $\tilde{P}_n(x)$  是首项系数为 1 的 Legendre 多项式.



## 2 正交多项式

### ■ 重要的正交多项式

#### • 勒让德 (Legendre) 多项式

##### 性质 1

$$\int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x)dx = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n \end{cases}$$

##### 性质 2 (奇偶性)

$$P_n(-x) = (-1)^n P_n(x).$$

$n$ 为偶数, 则为偶函数;  
 $n$ 为奇数, 则为奇函数.

##### 性质 3 (递推公式)

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots, \text{ 且 } p_0(x) = 1, p_1(x) = x$$

##### 性质 4: $P_n(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有 $n$ 个不同的零点。

证明: 见李庆扬《数值分析》第5版, 2018.

# 2 正交多项式

## ■ 重要的正交多项式

### • 勒让德 (Legendre) 多项式

$P_0(x) = 1, P_1(x) = x$ , 通过递推得

$$P_2(x) = (3x^2 - 1) / 2$$


$$P_3(x) = (5x^3 - 3x) / 2$$

$$P_4(x) = (35x^4 - 30x^2 + 3) / 8$$

$$P_5(x) = (63x^5 - 70x^3 + 15x) / 8$$

$$P_6(x) = (231x^5 - 315x^4 + 105x^2 - 5) / 16$$

⋮



Approximi\_Legendre.m



# 2 正交多项式

## ■ 重要的正交多项式

- 切比雪夫 (**Chebyshev**) 多项式
- 余弦的n倍角公式

$$\cos n\theta = A_n = \begin{vmatrix} \cos \theta & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos \theta & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos \theta & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & 1 & 2 \cos \theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \cos \theta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \cos \theta \end{vmatrix}_{n \times n}$$

$$\cos(0) = 1$$

$$\cos(x) = \cos x$$

$$\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

$$\cos(4x) = 8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1$$

$$\cos(5x) = 16 \cos^5 x - 20 \cos^3 x + 5 \cos x$$



## 2 正交多项式

### ■ 重要的正交多项式

#### • 切比雪夫 (Chebyshev) 多项式

区间为  $[-1, 1]$ , 权函数  $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ,

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad |x| \leq 1$$

若令  $x = \cos \theta$ , 则  $T_n(x) = \cos n\theta$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ . 由三角恒等式

$$\cos(n+1)\theta = 2 \cos \theta \cos n\theta - \cos(n-1)\theta, \quad n = 1, 2, \dots$$

性质1(递推关系)

$$\left. \begin{aligned} T_{n+1}(x) &= 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots, \\ T_0(x) &= 1, \quad T_1(x) = x. \end{aligned} \right\}$$



## 2 正交多项式

### ■ 重要的正交多项式

#### • 切比雪夫 (Chebyshev) 多项式

区间为  $[-1, 1]$ , 权函数  $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ,

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad |x| \leq 1$$

若令  $x = \cos \theta$ , 则  $T_n(x) = \cos n\theta$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ . 由三角恒等式

$$\cos(n+1)\theta = 2 \cos \theta \cos n\theta - \cos(n-1)\theta, \quad n = 1, 2, \dots$$

性质1(递推关系)

$$\left. \begin{aligned} T_{n+1}(x) &= 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots, \\ T_0(x) &= 1, \quad T_1(x) = x. \end{aligned} \right\}$$



## 2 正交多项式

### ■ 重要的正交多项式

#### • 切比雪夫 (Chebyshev) 多项式性质

##### 性质 (1): 正交性

$$(T_n, T_m) = \int_{-1}^1 \frac{T_n(x)T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi/2, & m = n \neq 0 \\ \pi, & m = n = 0 \end{cases}$$

##### 性质 (2): 奇偶性

$$T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$$

即:  $T_{2n}(x)$  只含偶次幂,  $T_{2n+1}(x)$  只含奇次幂。





## 2 正交多项式

### ■ 重要的正交多项式

#### • 切比雪夫 (**Chebyshev**) 多项式性质

#### 性质 (3): 递推公式

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中  $T_0(x) = 1, T_1(x) = x$

\* 前两项与 Legendre 多项式相同，但递推公式不同。

# 2 正交多项式

## ■ 重要的正交多项式

### • 切比雪夫 (Chebyshev) 多项式性质

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$


$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$$

$$T_6(x) = 32x^6 - 18x^4 + 18x^2 - 1$$

⋮

$T_n(x)$  的最高项系数为  $2^{n-1}, n \geq 1$

Approxi\_Chebyshev.m





## 2 正交多项式

### ■ 重要的正交多项式

#### • 切比雪夫 (Chebyshev) 多项式

**性质 (4):**  $T_n(x)$  在  $(-1,1)$  内有  $n$  个不同的零点

$$x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right) \quad k = 1, 2, \dots, n$$

①  $T_n(x)$  的零点都在  $(-1,1)$  内

②  $T_n(x)=0$  的根都是实数



## 2 正交多项式

- 重要的正交多项式
- 切比雪夫 (**Chebyshev**) 多项式

性质 (5):  $T_n(x)$  对零的偏差最小。

- $T_n(x)$  的最高项系数  $a_n = 2^{n-1}, (n=1,2,\dots)$

令  $\tilde{T}_0(x) = 1, \tilde{T}_n(x) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x) (n=1,2,\dots)$

则  $\tilde{T}_n(x)$  是首项系数为1的Chebyshev多项式。



# 2 正交多项式

## ■ 重要的正交多项式

### • 首项系数为1的切比雪夫 (Chebyshev) 多项式

定理:  $\tilde{H}_n$  是  $[-1,1]$  上次数  $\leq n$  的首项系数为 1 的多项式全体, 则对

$\forall p(x) \in \tilde{H}_n$ , 都有

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{T}_n(x)| \leq \max_{-1 \leq x \leq 1} |p(x)|$$

$$\text{且 } \max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{T}_n(x)| = \frac{1}{2^{n-1}}$$

证明详见: 徐利治, 王仁宏, 周蕴时. 函数逼近的理论与方法. 北京: 科学出版社, 1979.

等价描述:

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{T}_n(x)| = \min_{P \in \tilde{H}_n} \max_{-1 \leq x \leq 1} |P(x)| = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

$$\|\tilde{T}_n(x)\|_{\infty} \leq \|p(x)\|_{\infty}, \quad \forall p(x) \in \tilde{H}_n$$

即  $\tilde{T}_n(x)$  在集合  $\tilde{H}_n$  中无穷范数最小:  $\tilde{T}_n(x) = \arg \min_{p \in \tilde{H}_n(x)} \|p(x)\|_{\infty}$

最佳一致逼近多项式度量一致





## 2 正交多项式

- 重要的正交多项式
- 首项系数为**1**的切比雪夫 (**Chebyshev**) 多项式

### 几点注记

- ① 这里的无穷范数是指  $C[-1, 1]$  上的无穷范数
- ② 定理中的结论可推广为 “在所有次数不超过  $n$  的首项系数为 1 的多项式中,  $\tilde{T}_n(x)$  的无穷范数最小”
- ③ 该结论可用于计算  $n$  次多项式在  $[-1, 1]$  上的  $n-1$  次最佳一致逼近多项式

性质: 设  $f(x) \in H_n$ , 且首项系数为  $a_n \neq 0$ , 则  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上的  $n-1$  次最佳一致逼近多项式为

$$f(x) - a_n \tilde{T}_n(x)$$





# 2 正交多项式

## ■ 重要的正交多项式

### • 切比雪夫 (Chebyshev) 多项式

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \quad n = 1, 2, 3, \dots$$


$$\text{其中 } T_0(x) = 1, T_1(x) = x$$

$$\tilde{T}_n(x) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x), n = 1, 2, \dots$$

例 求  $f(x) = 2x^3 + x^2 + 2x - 1$  在  $[-1, 1]$  上的二次最佳一致逼近多项式。

解:

$$\begin{aligned}
 p(x) &= f(x) - a_3 \tilde{T}_3(x) \\
 &= 2x^3 + x^2 + 2x - 1 - 2 \left( x^3 - \frac{3}{4}x \right) \\
 &= x^2 + \frac{7}{2}x - 1
 \end{aligned}$$



注: 计算  $n$  次多项式在  $[a, b]$  上的  $n - 1$  次最佳一致逼近多项式需先作变量替换

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t, t \in [-1, 1]$$



◆ Q & A

◆ 谢谢

WDP