

微积分 I (第一层次) 期中试卷 (2018.11.17)

一、简答题: (5分×8 = 40 分)

1. 用极限的定义证明: $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{3}$.
2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^4 + 4^n}$.
3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{2}{x}}$.
4. 设 $y = x \sqrt{1 - x^2} + \arcsin x$, 求 dy .
5. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right)$.
6. 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x \arcsin x}$.
7. 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left((1 + \ln(1 + x))^{2x} - 1 \right)$.
8. 设 x 为基准无穷小, 求 $\ln(1 + x) - \arctan x$ 的主部.

二、(7分) 设 $f(x) = \frac{5x - 1}{2x^2 + x - 1}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

三、(7分) 证明方程 $\cos x - \frac{1}{x} = 0$ 有无穷多个正根.

四、(7分) 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ 2y - ty^2 + e^t = 5a \end{cases}$ 所确定(其中 a 为常数), 求 $\frac{dy}{dx}$.

五、(8分) 设 $f(x) = \arctan x - \arctan \frac{x-1}{x+1}$, 其中 $x > -1$.

(1) 证明: $f(x)$ 是常数函数; (2) 求 $\arctan(2 - \sqrt{3})$ 的值.

六、(8分) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 + \ln(1 + x^2), & x > 0; \\ ax \sin x, & x \leq 0, \end{cases}$ 且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处二阶可导. 试求 a 的值以及 $f''(0)$.

七、(8分) 设 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}}$, 试确定 $f(x)$ 的间断点及其类型.

八、(8分) (1) 对任意的正整数 n , 证明 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$;

(2) 令 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 极限存在.

九、(7分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, $f(0) = 1, f(1) + 2f(2) = 3$. 试证明: $\exists \xi \in (0, 2)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

微积分 I(第一层次)期中试卷 (2019.11.16)

一、计算下列各题 (每题6分, 共48分)

1. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1 - \sin^3 x} = 1$.
2. 用 $\varepsilon - N$ 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{1 + n^2}} = 1$.
3. 求函数 $y = \sqrt{\frac{x+2}{x+5}} \sin x + (\arctan x)^{\tan x}$ 的一阶导数和微分。
4. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}}}{2} \right)^n$, 其中 $a \geq 0, b \geq 0$.
5. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 + e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 讨论函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的可微性.
6. 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
7. 设 $f(x) = x \ln(1 + x) + \cos x + ax^2 + bx + c = o(x^2)$, 求 a, b, c 的值. 若以 x 为基准无穷小, 求 $f(x)$ 关于 x 的无穷小阶数和无穷小主部.
8. 设函数 $y(x)$ 由如下参数方程定义: $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \operatorname{arccot} t + \ln(1 + t^2). \end{cases}$ 试求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

二、(10分) 确定函数 $f(x)$ 的间断点, 并说明是哪种类型的间断点。

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{1 - e^{\frac{1}{1-x}}}, & x \neq 0, x \neq 1, \\ 0, & x = 0, \\ \sin 1, & x = 1. \end{cases}$$

三、(10分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且导函数 $f'(x)$ 严格单调递增. 若 $f(a) = f(b)$, 证明对一切 $x \in (a, b)$, 有 $f(x) < f(a) = f(b)$.

四、(10分) 求由方程 $e^{x+y} - xy - e = 0$ 确定的曲线在点 $(0, 1)$ 处的切线和法线方程。

五、(12分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 又 $f(a) = 1, f(b) = 0$, 证明

- (1) 存在 $\xi_1 \in (a, b)$, 使得 $f(\xi_1) = \frac{4}{5}$;
- (2) 存在 $\xi_2, \xi_3 \in (a, b)$ ($\xi_2 \neq \xi_3$), 使得 $\frac{1}{f'(\xi_2)} + \frac{4}{f'(\xi_3)} = 5(a - b)$.

六、(10分) 设 $f(x) = |x|^n g(x)$, 其中 n 为奇数, $g(x)$ 有 n 阶导数. 在什么条件下 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处有 n 阶导数?

微积分 I(第一层次)期中试卷(2020.11.21)

一、计算下列各题(每题6分, 共48分)

1. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{x} = 1$.
2. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{2n} \right) = 0$.
3. 设 $f(x) = \begin{cases} x^{2x} \sin x, & x > 0, \\ x, & x \leq 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$.
4. 设 $0 < x_1 < 1$, 且 $x_{n+1} = -x_n^2 + 2x_n$ ($n \geq 1$), 证明数列 $\{x_n\}$ 存在极限并求该极限.
5. 求由方程 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} - \arctan \frac{y}{x} = \ln 2$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数.
6. 求曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线和法线方程.
7. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{\sqrt{1+x^2} - 1}$.
8. 已知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left(\arctan \frac{2020}{n-1} - \arctan \frac{2020}{n+1} \right)$ 是不为零的常数, 求 α 以及该极限值.

二、(10分) 确定以下函数的间断点, 并说明是哪种类型的间断点.

$$f(x) = \begin{cases} \sin \pi x, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

三、(12分) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 求 $1 - \cos(\sin x) + a \ln(1 + x^2)$ 的无穷小阶数和无穷小主部.

四、(10分) 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 的某邻域内可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}$, $f(2) = 1$, 计算 $f'''(2)$.

五、(10分) 设 $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$, 求 $f(x)$ 的各阶导函数.

六、(10分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 且 $f(0) = 0$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: 在 $[0, 1]$ 上, $f(x) \equiv 0$.

微积分 I (第一层次) 期中试卷参考答案18.11.17

一、 1. 证明: $\left| \sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{3} \right| = \frac{|(x-2)(x+2)|}{\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{3}} \leq 5|x-2|$ (设 $0 < |x-2| < 1$)

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{5}\right\}$, 则当 $0 < |x-2| < \delta$ 时, 总有 $\left| \sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{3} \right| < \varepsilon$.

2. 解: $4 \leq \sqrt[n]{n^4 + 4^n} \leq \sqrt[n]{n^4 \cdot 4^n} = 4(\sqrt[n]{n})^4$, $\lim_{n \rightarrow \infty} 4 = \lim_{n \rightarrow \infty} 4(\sqrt[n]{n})^4 = 4$, 由夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^4 + 4^n} = 4$.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1+2x)^{\frac{1}{2x}} \right]^4 = e^4$.

4. $dy = y' dx = 2\sqrt{1-x^2} dx$.

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right) \stackrel{\frac{1}{x} = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+t)^{\frac{1}{t}} - e}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\ln(1+t)/t} - 1}{t} = e \cdot \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} = -\frac{e}{2}$,
所以原式 $= -\frac{e}{2}$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x \arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left((1+\ln(1+x))^{2x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x \ln(1+\ln(1+x))} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \ln(1+\ln(1+x))}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(1+x)}{x} = 2$.

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \arctan x}{cx^k} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+x^2}}{ckx^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)}{(1+x)(1+x^2)ckx^{k-1}} \stackrel{k=2}{=} -\frac{1}{2c} = 1$,

所以 $k=2, c=-\frac{1}{2}$, 无穷小主部为 $-\frac{x^2}{2}$.

二、 $f(x) = \frac{5x-1}{(x+1)(2x-1)} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{2\left(x-\frac{1}{2}\right)}$, 所以 $f^n(x) = (-1)^n n! \left(\frac{2}{(1+x)^{n+1}} + \frac{1}{2(x-\frac{1}{2})^{n+1}} \right)$.

三、 证明: 令 $f(x) = \cos x - \frac{1}{x}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(2n\pi) = 1 - \frac{1}{2n\pi} > 0$, $f((2n+1)\pi) = -1 - \frac{1}{(2n+1)\pi} < 0$, 由零点定理可知, 存在 $\xi \in (2n\pi, (2n+1)\pi)$, 使得 $f(\xi) = 0$. n 取所有正整数, 所以 $f(x) = 0$ 有无穷多个正根.

四、 $\frac{dy}{dx} = \frac{(y^2 - e^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}$.

五、 (1) $f'(x) \equiv 0$, 所以 $f(x)$ 是常值函数 ($x > -1$). 令 $x=1$ 得 $f(1) = \frac{\pi}{4}$, 所以 $\arctan x - \arctan \frac{x-1}{x+1} = \frac{\pi}{4}$.

(2) 由 (1) 知 $\arctan(2 - \sqrt{3}) = \frac{\pi}{4} + \arctan \frac{2 - \sqrt{3} - 1}{2 - \sqrt{3} + 1} = \frac{\pi}{4} - \arctan \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi}{12}$.

六、 $f'(x) = \begin{cases} 2x + \frac{2x}{1+x^2}, & x > 0; \\ 0, & x = 0; \\ a \sin x + ax \cos x, & x < 0, \end{cases}$ $f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x + \frac{2x}{1+x^2}}{x} = 4$;

$f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a \sin x + ax \cos x}{x} = 2a$; 所以 $a=2$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, $f''(0)=4$.

七、0是第二类间断点(无穷间断点),1是第一类间断点(跳跃间断点).

八、提示:(1)用函数的单调性证明当 $x>0$ 时, $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$,取 $x=\frac{1}{n}$ 即得;

(2)由(1)可得 $a_n-a_{n-1}<0$,所以数列 $\{a_n\}$ 单调减;又由(1)可得

$$\ln(1+\frac{1}{1})=\ln 2-\ln 1<1,\quad \ln(1+\frac{1}{2})=\ln 3-\ln 2<\frac{1}{2},\quad \dots,\quad \ln(1+\frac{1}{n-1})=\ln n-\ln(n-1)<\frac{1}{n-1},$$

各式相加得 $\ln n<1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n-1}<1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n}$,即 $a_n>0$.数列 $\{a_n\}$ 单调减有下界,所以 $\lim_{n\rightarrow\infty}a_n$ 极限存在.

九、提示:用介值定理证明 $\exists \eta \in [1,2]$,使得 $f(\eta)=1$,由拉格朗日中值定理可得 $\exists \xi \in (0,\eta)$,使得 $f'(\xi)=0$.

微积分I(第一层次)期中试卷参考答案 19.11.16

一、1. $\forall \varepsilon > 0$, 由 $|\sqrt{1-\sin^3 x} - 1| = \frac{|\sin^3 x|}{1 + \sqrt{1-\sin^3 x}} \leq |\sin x|^3 < \varepsilon$, 取 $\delta = \varepsilon^{1/3}$, 当 $0 < |x-0| < \delta$ 时有 $|\sqrt{1-\sin^3 x} - 1| < \varepsilon$.

2. $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\left| \frac{n}{\sqrt{1+n^2}} - 1 \right| = \frac{|\sqrt{1+n^2}-n|}{\sqrt{1+n^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+n^2}(n+\sqrt{1+n^2})} \leq \frac{1}{n}$, 取 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$, 当 $n > N$ 时, $\left| \frac{n}{\sqrt{1+n^2}} - 1 \right| < \varepsilon$.

3. 令 $y_1 = \sqrt{\frac{x+2}{x+5}} \sin x$, $y_2 = (\arctan x)^{\tan x}$, 则 $y' = y'_1 + y'_2$, $dy = (y' + y')dx$, 其中

$$y'_1 = y_1(\ln y_1)' = \frac{y_1}{2} \left[\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+5} + \frac{\cos x}{\sin x} \right],$$

$$y'_2 = y_2(\ln y_2)' = y_2 \left[\sec^2 x \ln \arctan x + \frac{\tan x}{(1+x^2)\arctan x} \right].$$

4. 当 $ab=0$ 时,易见原式为0.当 $ab\neq 0$ 时,

$$\text{原式} = \lim_{n\rightarrow\infty} \left(1 + \left(\frac{a^{1/n} + b^{1/n}}{2} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{\frac{a^{1/n}+b^{1/n}}{2}-1} n \left(\frac{a^{1/n}+b^{1/n}}{2} - 1 \right)} = \exp \left\{ \frac{1}{2} \lim_{n\rightarrow\infty} \left(\frac{a^{1/n}-1}{1/n} + \frac{b^{1/n}-1}{1/n} \right) \right\} = \sqrt{ab}.$$

5. 由于 $f'_+(0) = \lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{1+e^{1/x}}}{x} = 0$, $f'_-(0) = \lim_{x\rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\rightarrow 0^-} \frac{\frac{x}{1+e^{1/x}}}{x} = 1$.

则 $f'_-(0) \neq f'_+(0)$,故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导,从而不可微.

6. 首先由归纳法可有 $x_n > 0$,又由于 $0 < x_{n+1} = \ln(1+x_n) < x_n$,故数列 x_n 单调递减有下界,故收敛,设极限是 A ,则 $\ln(1+A) = A$,从而有 $A=0$.

7. 由 $f(x) = o(x^2)$ 可得 (1) $\lim_{x\rightarrow 0} f(x) = 0$,即 $1+c=0$,从而 $c=-1$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x) + \cos x + ax^2 + bx - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln(1+x) + \frac{\cos x - 1}{x} + ax + b \right) = b = 0;$$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$, 即

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x) + \cos x + ax^2 - 1}{x^2} &\stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + \frac{x}{1+x} - \sin x + 2ax}{2x} \\ &\stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} + \frac{1}{(1+x)^2} - \cos x + 2a}{2} = \frac{1}{2} + a = 0 \implies a = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x) + \cos x - \frac{1}{2}x^2 - 1}{x^k} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + \frac{x}{1+x} - \sin x - x}{kx^{k-1}} \\ &\stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} + \frac{1}{(1+x)^2} - \cos x - 1}{k(k-1)x^{k-2}} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{2}{(1+x)^3} + \sin x}{k(k-1)(k-2)x^{k-3}} \end{aligned}$$

从而取 $k = 3$, 得到 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = -\frac{1}{2}$. 则 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 的无穷小阶数为 3, 无穷小主部为 $-\frac{1}{2}x^3$.

$$8. \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{1}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = 2t - 1, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(2t-1)'}{\frac{dx}{dt}} = 2(1+t^2).$$

二、函数在 $x \neq 0, x \neq 1$ 的地方显然连续; 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1-x}}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} \frac{1-x}{x} x \sin \frac{1}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x},$$

不存在, 所以 $x = 0$ 是第二类间断点, 且为振荡间断点。由于

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = \sin 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = 0,$$

所以 $x = 1$ 是第一类间断点, 且为跳跃间断点。

三、任给 $x \in (a, b)$, 由中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, x), \xi_2 \in (x, b), \xi_1 < \xi_2$ 且

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < f'(\xi_2) = \frac{f(b) - f(x)}{b - x}$$

可推出 $f(x) < f(a)$.

四、切线方程为 $y = \frac{1-e}{e}x + 1$, 法线方程为 $y = \frac{e}{e-1}x + 1$.

五、证明: (1) 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, 从而在 $[a, b]$ 连续。又 $f(b) = 0 < \frac{4}{5} < 1 = f(a)$, 由介值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, b)$, 使得 $f(\xi_1) = \frac{4}{5}$.

(2) 由 Lagrange 中值定理, 分别考虑区间 $[a, \xi_1], [\xi_1, b]$, 可得

$$f(\xi_1) - f(a) = f'(\xi_2)(\xi_1 - a), \quad f(b) - f(\xi_1) = f'(\xi_3)(b - \xi_1)$$

注意到 $f(a) = 1, f(b) = 0, f(\xi_1) = \frac{4}{5}, f'(x) \neq 0$, 整理可得

$$-\frac{1}{5} \frac{1}{f'(\xi_2)} = \xi_1 - a, \quad -\frac{4}{5} \frac{1}{f'(\xi_3)} = b - \xi_1$$

两式相加得证。

六、解：由莱布尼兹公式可直接求出 $f(x)$ 在 $x \neq 0$ 处的 k ($0 < k \leq n-1$) 阶导数为

$$f^{(k)}(x) = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)x^{n-k}g(x)\operatorname{sgn}(x) + \sum_{i=0}^{k-1} F_{n-i}(x)g^{(k-i)}(x)\operatorname{sgn}(x)$$

其中 $F_{n-i}(x)$ 为 x 的 $n-i$ 次单项式。由导数的定义可有对任意 $0 < k \leq n-1$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 k 阶导数为零. 则 $f^{(n-1)}(x)$ 当 $g(0)=0$ 时可导, 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 n 阶可导.

微积分 I(第一层次)期中试卷参考答案 2020.11.21

一、1. 不妨设 $|x-1| < 1$, 即 $0 < x < 2$. $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{1, \varepsilon\}$,

$$\text{当 } 0 < |x-1| < \delta \text{ 时, 有 } \left| \sqrt[3]{x} - 1 \right| = \frac{|x-1|}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1} < |x-1| < \varepsilon.$$

2. 解: 当 n 为偶数时,

$$0 < \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{2n} = \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) - \cdots - \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \right) < \frac{1}{n}.$$

当 n 为奇数时,

$$0 < \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{2n} = \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) - \cdots - \left(\frac{1}{2n-2} - \frac{1}{2n-1} \right) - \frac{1}{2n} < \frac{1}{n}.$$

由夹逼准则即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{2n} \right) = 0$.

$$3. f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{2x} \sin x}{x} = 1, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x} = 1,$$

$$\text{所以 } f'(x) = \begin{cases} x^{2x} (2(1 + \ln x) \sin x + \cos x), & x > 0, \\ 1, & x \leq 0, \end{cases}$$

4. 首先由归纳法可得 $0 < x_n < 1$, 又由于 $x_{n+1} - x_n = x_n(1 - x_n) > 0$, 因此数列 x_n 单调递增有上界, 故收敛. 设极限是 A , 则 $A^2 = A$, 由 $\{x_n\}$ 单调递增可知 $A = 1$.

$$5. \frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y} (x \neq y). \quad 6. \text{切线方程为 } y = \frac{1}{2}x + 1, \text{ 法线方程为 } y = -2x + 1.$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{\sqrt{1+x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+x}} - \frac{1}{\sqrt{1-x}}}{2x} = -\frac{1}{2}.$$

$$8. \arctan \frac{2020}{n-1} - \arctan \frac{2020}{n+1} = \frac{1}{1+\xi^2} \left(\frac{2020}{n-1} - \frac{2020}{n+1} \right) \sim \frac{4040}{n^2}, \quad \text{其中 } \xi \in \left(\frac{2020}{n+1}, \frac{2020}{n-1} \right),$$

故 $a = 2$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{2020}{n-1} - \arctan \frac{2020}{n+1} \right) = 4040$.

二、当 $x_0 = k$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, $f(x_0) = 0$, f 连续.

当 $x_0 \neq k$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, 取有理数序列 $\{x_{n,1}\}$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n,1} = x_0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{n,1}) = \sin \pi x_0$; 取无理数序列 $\{x_{n,2}\}$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n,2} = x_0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{n,2}) = 0$. 故函数在 $x = x_0$ 处不连续, 且为第二类间断点.

三、解: 当 $a \neq -\frac{1}{2}$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sin x) + a \ln(1 + x^2)}{x^2} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) \cos x + \frac{2ax}{1+x^2}}{2x} = \frac{1}{2} + a \neq 0.$$

当 $a = -\frac{1}{2}$ 时,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sin x) - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2)}{x^4} &\stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) \cos x - \frac{x}{1+x^2}}{4x^3} \\ &\stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) \cos^2 x - \sin(\sin x) \sin x + \frac{x^2 - 1}{(1+x^2)^2}}{12x^2} \\ &\stackrel{0}{=} -\frac{1}{12} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(\sin x) \cos^3 x - \cos(\sin x) \sin 2x + \frac{6x - 2x^3}{(1+x^2)^3}}{24x} = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

因此, $a \neq -\frac{1}{2}$ 时无穷小主部为 $\left(\frac{1}{2} + a\right)x^2$; $a = -\frac{1}{2}$ 时无穷小主部为 $\frac{1}{24}x^4$.

四、 $f'''(2) = 2e^3$.

五、 $f(x) = x + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right)$, 因此 $f'(x) = \frac{x^4 - 3x^2}{(x^2 - 1)^2}$;

$$\text{当 } n > 1 \text{ 时, } f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{2} \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right].$$

六、解法一: 若在 $[0, 1]$ 上, $f(x)$ 不恒为零, 设 $|f(x)|$ 在 $x_0 \in (0, 1]$ 处达到最大值. 由中值定理, 存在 $\xi \in (0, x_0) \subset (0, 1]$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0}$. 从而

$$|f'(\xi)| = \frac{|f(x_0)|}{x_0} \geq |f(x_0)| > \frac{1}{2}|f(x_0)| \geq \frac{1}{2}|f(\xi)|.$$

因此假设不真, 结论成立.

解法二: 由中值定理, 有 $f(x) = f(x) - f(0) = xf'(\xi_1)$, $0 < \xi_1 < x$. 由 $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$, 得到

$$|f(x)| = |xf'(\xi_1)| \leq \frac{1}{2}x|f(\xi_1)| \leq \frac{1}{2}|f(\xi_1)|.$$

在 $[0, \xi_1]$ 上再用拉格朗日中值定理, 得 $f(\xi_1) = \xi_1 f'(\xi_2)$, $0 < \xi_2 < \xi_1$. 因此 $|f(x)| \leq \frac{1}{2}|f(\xi_1)| \leq \frac{1}{4}|f(\xi_2)|$. 类似地, 在 $[0, \xi_2], \dots, [0, \xi_n]$ 上继续用拉格朗日中值定理, 最终得到:

$$|f(x)| \leq \frac{f(\xi_n)}{2^n} \leq \frac{M}{2^n}.$$

其中 M 为函数 $|f(x)|$ 的上界. 令 $n \rightarrow \infty$ 即得.